

Тести

На тему: „Інфекційні хвороби жуйних тварин”

Варіант №1

1. Які із вказаних захворювань викликаються бактеріями?

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. парагрип | 3. ЕМКАР | 5. трихофітія |
| 2. паратуберкульоз | 4. лейкоз | 6. немає правильної відповіді |

2. Які із вказаних захворювань викликаються хламідіями?

- | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| 1. парагрип | 3. ЕМКАР | 5. трихофітія | 7. бруцельоз |
| 2. паратуберкульоз | 4. лейкоз | 6. немає правильної відповіді | |

3. При яких хворобах застосовують симптоматичне лікування?

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. парагрип | 3. ЕМКАР | 5. немає правильної відповіді |
| 2. паратуберкульоз | 4. лейкоз | |

4. Латинська назва збудника емфізематозного карбункула ?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Clostridium chauvoei | 3. Clostridium botulinum |
| 2. Clostridium septicum | 4. Bacillus anthracis |

5. Які з перерахованих симптомів спостерігаються у хворих на парагрип тварин?

1. катаральне запалення верхніх дихальних шляхів
2. лихоманка
3. нефрити
4. гастроентерити
5. виразки на слизовій оболонці ротової порожнини
6. запалення суглобів
7. аборти

6. Що роблять із хворими на парагрип тваринами?

1. ізолюють, а потім забивають на м'ясо
2. тварин забивають, а туші спалюють
3. ізолюють і лікують симптоматичними засобами або сироваткою реконвалесцентів
4. лікувати тварин заборонено

7. З якого віку починають проводити серологічні дослідження на лейкоз?

1. з 10 добового віку
2. з 20 добового віку
3. з 1 місячного віку
4. з 2-х місячного віку
5. з 6 –ти місячного віку

10. Що роблять з тушами при забої хворих на ІРТ тварин?

1. внутрішні органи з ознаками запалення утилізують, а м'ясо використовують без обмежень
2. тушу разом зі шкірою і внутрішніми органами утилізують
3. м'ясо – на копченості, а внутрішні органи – на промпереробку
4. м'ясо разом з внутрішніми органами використовують на варені ковбаси

або консерви

11. До якої родини вірусів належить збудник вірусної діареї?

1. герпесвірусів
2. параміксовірусів
3. тоговірусів
4. аденовірусів
5. ретровірусів

12. Коли частіше проявляються клінічні ознаки у хворих на паратуберкульоз тварин?

1. через 2-4 місяці після зараження
2. через 3-4 роки після зараження
3. після 1-го або 2-го отелення
4. по досягненню 5-6 літнього віку

13. Яка основна форма перебігу паратуберкульозу у тварин?

1. хронічна
2. підгостра
3. гостра
4. блискавична

14. Чи існує плацентарний бар'єр для збудників кампілобактеріозу?

1. існує, у плід можуть проникнути тільки токсини
2. існує, у плід можуть проникнути тільки антитіла
3. існує тільки для капсулоутворюючих штамів
4. не існує

15. Якими засобами лікують хворих на кампілобактеріоз тварин?

1. антибіотикотерапія
2. існує специфічне лікування
3. аутогемотерапія
4. тварини не лікуються, а підлягають забою на санбойні м'ясокомбінату

16. Назвіть три стадії розвитку інфекційного процесу у хворих на лейкоз ВРХ тварин

1. початкова
2. генетична
3. алергічна
4. функціональна
5. розгорнута
6. термінальна

17. Які ознаки характерні для термінальної стадії розвитку лейкозу ВРХ?

1. збільшення поверхневих і глибоких лімфатичних вузлів
2. поява ознак ураження ЦНС
3. пухлинні утворення в печінці, лімфовузлах та інших органах і тканинах

4. поява позитивної алергічної реакції на лейкозний антиген
5. набряки підшкірної клітковини в ділянці між щелепового простору
6. значні морфологічні зміни лейкоцитів

18. В яких випадках оздоровлення неблагополучних щодо лейкозу стад ВРХ проводять шляхом здачі всіх РІД-позитивних тварин?

1. при інфікованості стада тварин до 6%
2. при інфікованості стада тварин більше 10%
3. коли РІД-позитивні тварини є молодняк до 1 року
4. коли РІД-позитивні тварини є старше 5 років